

Chapitre 02 – Cours

Fonctions, limites, continuité et logarithme

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à :

- Étudier une fonction et identifier une asymptote
- Résoudre avec le logarithme et exploiter la continuité

Comprendre les notions

Limites et continuité

Définition – Notion de départ

Une limite décrit le comportement d'une fonction près d'une borne ou à l'infini. L'approche est intuitive, appuyée sur les courbes et les fonctions de référence : carré, cube, racine, inverse, exponentielle et logarithme. Les règles opératoires sont admises lorsque les expressions ne sont pas indéterminées. Une fonction continue sur un intervalle prend toutes les valeurs intermédiaires ; si elle est strictement monotone, une valeur de son image possède un unique antécédent.

Fonctions réciproques

Propriété – Lecture et conséquences

L'exponentielle associe à tout réel une valeur strictement positive. Le logarithme népérien effectue le chemin inverse : $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$ pour x positif. Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y=x$. Le logarithme est croissant, de dérivée $1/x$, et possède des limites infinies en zéro positif et à l'infini. Pour des réels positifs a et b , $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$.

Propriété – Lecture et conséquences

Ces propriétés transforment une évolution multiplicative en évolution additive et expliquent l'intérêt historique des tables de logarithmes.

Première lecture : situation du chapitre

Propriété – Lecture et conséquences

Un capital est multiplié chaque année par 1,05. Doubler le capital revient à résoudre $1,05^n \geq 2$. En prenant le logarithme, $n \ln(1,05) \geq \ln 2$. Comme le coefficient est positif, $n \geq \ln 2 / \ln(1,05)$. Si n représente des années entières, il faut prendre l'entier supérieur et vérifier le seuil, plutôt que simplement arrondir au plus proche.

Un logarithme composé

Définition – Un logarithme composé

Pour une fonction u dérivable et strictement positive sur l'intervalle étudié, le logarithme composé se dérive en divisant sa dérivée par elle-même. La positivité est une condition d'existence, à traiter avant toute simplification.

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad \ln a = \ln b \iff a = b \quad (a, b > 0).$$

Une inéquation conserve son sens sous $\ln$, car cette fonction est strictement croissante. Une division ultérieure par un logarithme négatif inverse en revanche le sens de l'inégalité.

Deux exemples résolus

Exemple résolu – Doubler un capital


1. Un capital sans versement est multiplié chaque année par 1,05. Après n années, le rapport au capital initial vaut $1,05^n$; doubler demande $1,05^n \geq 2$.
 2. Le logarithme donne $n \ln(1,05) \geq \ln 2$, donc $n \geq \ln 2 / \ln(1,05) \approx 14,21$.
 3. Le premier nombre entier d'années est quinze. Quatorze ans ne suffisent pas ; arrondir au plus proche aurait donné une réponse trop petite.
-

Exemple résolu – Localiser une solution continue

1. Sur $[1; 2]$, posons $f(x) = \ln x + x - 2$. La fonction est continue et sa dérivée $1/x + 1$ est positive.

2. On a $f(1) = -1$ et $f(2) = \ln 2 > 0$: il existe une seule solution dans cet intervalle.
 3. Comme $f(1,5) = \ln(1,5) - 0,5 < 0$ et $f(1,6) = \ln(1,6) - 0,4 > 0$, la solution est comprise entre 1,5 et 1,6.
-

Une représentation pour comprendre



La fonction logarithme : croissance lente et domaine strictement positif.

La courbe du logarithme passe par $(1; 0)$ et $(e; 1)$; elle monte en restant concave. Son asymptote verticale est l'axe des ordonnées. L'égalité $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ explique pourquoi des multiplications successives deviennent des additions. L'inégalité $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$ découle de la concavité et de la tangente en un. Elle est globale, tandis qu'écrire $\ln(1+h) \approx h$ décrit une approximation près de zéro.

Confondre ces deux lectures ferait perdre soit le sens de l'inégalité, soit le domaine de validité de l'approximation.

À retenir – Mini-bilan

Toujours imposer des arguments positifs. Le logarithme transforme produits et puissances, mais pas les sommes. Pour les limites indéterminées, utiliser les croissances comparées ; pour les variations, le quotient u'/u .
