

Chapitre 08 – Exercices

Statistiques bivariées, ajustement et causalité

20 exercices progressifs

Exercice 1 – Point moyen

On observe $(0; 1)$, $(1; 3)$ et $(2; 5)$. Calculer le point moyen et trouver une droite passant par les trois points.

Exercice 2 – Point moyen

On observe $(0; 2)$, $(1; 4)$ et $(2; 6)$. Calculer le point moyen et trouver une droite passant par les trois points.

Exercice 3 – Point moyen

On observe $(0; 3)$, $(1; 5)$ et $(2; 7)$. Calculer le point moyen et trouver une droite passant par les trois points.

Exercice 4 – Point moyen

On observe $(0; 4)$, $(1; 6)$ et $(2; 8)$. Calculer le point moyen et trouver une droite passant par les trois points.

Exercice 5 – Point moyen

On observe $(0; 5)$, $(1; 7)$ et $(2; 9)$. Calculer le point moyen et trouver une droite passant par les trois points.

Exercice 6 – Interpoler ou extrapoler

Un ajustement $y = 3x + 1$ utilise des abscisses entre 0 et 10. Estimer y pour $x=4$ puis $x=12$. Qualifier les estimations.

Exercice 7 – Interpoler ou extrapoler

Un ajustement $y = 3x + 2$ utilise des abscisses entre 0 et 10. Estimer y pour $x=4$ puis $x=12$. Qualifier les estimations.

Exercice 8 – Interpoler ou extrapoler

Un ajustement $y = 3x + 3$ utilise des abscisses entre 0 et 10. Estimer y pour $x=4$ puis $x=12$. Qualifier les estimations.

Exercice 9 – Interpoler ou extrapoler

Un ajustement $y = 3x + 4$ utilise des abscisses entre 0 et 10. Estimer y pour $x=4$ puis $x=12$. Qualifier les estimations.

Exercice 10 – Interpoler ou extrapoler

Un ajustement $y = 3x + 5$ utilise des abscisses entre 0 et 10. Estimer y pour $x=4$ puis $x=12$. Qualifier les estimations.

Exercice 11 – Ajustement exponentiel

Une grandeur vérifie $y = 2 \times 2^x$. Poser $z = \ln y$ et déterminer la relation affine entre z et x . Retrouver la valeur y en $x=3$.

Exercice 12 – Ajustement exponentiel

Une grandeur vérifie $y = 3 \times 2^x$. Poser $z = \ln y$ et déterminer la relation affine entre z et x . Retrouver la valeur y en $x=3$.

Exercice 13 – Ajustement exponentiel

Une grandeur vérifie $y = 4 \times 2^x$. Poser $z = \ln y$ et déterminer la relation affine entre z et x . Retrouver la valeur y en $x=3$.

Exercice 14 – Ajustement exponentiel

Une grandeur vérifie $y = 5 \times 2^x$. Poser $z = \ln y$ et déterminer la relation affine entre z et x . Retrouver la valeur y en $x=3$.

Exercice 15 – Ajustement exponentiel

Une grandeur vérifie $y = 6 \times 2^x$. Poser $z = \ln y$ et déterminer la relation affine entre z et x . Retrouver la valeur y en $x=3$.

Exercice 16 – Approfondissement — Moindres carrés et interprétation

Pour trois observations, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 5$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 2$ et $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6$. Calculer la droite des moindres carrés de y en x . Une corrélation élevée prouverait-elle une causalité ?

Exercice 17 – Approfondissement — Moindres carrés et interprétation

Pour trois observations, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 6$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 2$ et $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6$. Calculer la droite des moindres carrés de y en x . Une corrélation élevée prouverait-elle une causalité ?

Exercice 18 – Approfondissement — Moindres carrés et interprétation

Pour trois observations, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 7$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 2$ et $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6$. Calculer la droite des moindres carrés de y en x . Une corrélation élevée prouverait-elle une causalité ?

Exercice 19 – Approfondissement — Moindres carrés et interprétation

Pour trois observations, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 8$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 2$ et $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6$. Calculer la droite des moindres carrés de y en x . Une corrélation élevée prouverait-elle une causalité ?

Exercice 20 – Approfondissement — Moindres carrés et interprétation

Pour trois observations, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 9$, $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2$ et $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6$. Calculer la droite des moindres carrés de y en x. Une corrélation élevée prouverait-elle une causalité ?