

Chapitre 04 – Corrections

Représentations paramétriques et équations de plans

20 exercices progressifs – Solutions détaillées

Exercice 1 – Appartenance à une droite

Pour A, $t = 2$ vérifie les trois coordonnées : A appartient à d. Pour B, $x = 3$ impose $t = 1$, mais la deuxième coordonnée devrait être 0 : B n'appartient pas à d.

Exercice 2 – Appartenance à une droite

Pour A, $t = 2$ vérifie les trois coordonnées : A appartient à d. Pour B, $x = 3$ impose $t = 1$, mais la deuxième coordonnée devrait être 1 : B n'appartient pas à d.

Exercice 3 – Appartenance à une droite

Pour A, $t = 2$ vérifie les trois coordonnées : A appartient à d. Pour B, $x = 3$ impose $t = 1$, mais la deuxième coordonnée devrait être 2 : B n'appartient pas à d.

Exercice 4 – Appartenance à une droite

Pour A, $t = 2$ vérifie les trois coordonnées : A appartient à d. Pour B, $x = 3$ impose $t = 1$, mais la deuxième coordonnée devrait être 3 : B n'appartient pas à d.

Exercice 5 – Appartenance à une droite

Pour A, $t = 2$ vérifie les trois coordonnées : A appartient à d. Pour B, $x = 3$ impose $t = 1$, mais la deuxième coordonnée devrait être 4 : B n'appartient pas à d.

Exercice 6 – Plan normal

$u \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ donne $(x - 1) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $\boxed{x + 2y - z - 1 = 0}$.

Exercice 7 – Plan normal

$u \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ donne $(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $\boxed{x + 2y - z - 2 = 0}$.

Exercice 8 – Plan normal

$u \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ donne $(x - 3) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $\boxed{x + 2y - z - 3 = 0}$.

Exercice 9 – Plan normal

$u \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ donne $(x - 4) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $\boxed{x + 2y - z - 4 = 0}$.

Exercice 10 – Plan normal

$u \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ donne $(x - 5) + 2(y - 1) - (z - 2) = 0$, soit $\boxed{x + 2y - z - 5 = 0}$.

Exercice 11 – Intersection droite-plan

En substituant : $t + 2t + 1 + t = 9$, donc $t = 2$. Intersection unique $I(2; 4; 3)$.

Exercice 12 – Intersection droite-plan

En substituant : $t + 2t + 2 + t = 10$, donc $t = 2$. Intersection unique $I(2; 4; 4)$.

Exercice 13 – Intersection droite-plan

En substituant : $t + 2t + 3 + t = 11$, donc $t = 2$. Intersection unique $I(2; 4; 5)$.

Exercice 14 – Intersection droite-plan

En substituant : $t + 2t + 4 + t = 12$, donc $t = 2$. Intersection unique $I(2; 4; 6)$.

Exercice 15 – Intersection droite-plan

En substituant : $t + 2t + 5 + t = 13$, donc $t = 2$. Intersection unique $I(2; 4; 7)$.

Exercice 16 – Approfondissement — Étudier une famille d'intersections

Sur d , $x + y + z = 1$ pour tout t . Si $a = 1$, toute la droite est contenue dans le plan. Si $a \neq 1$, il n'y a aucune intersection : la droite est strictement parallèle au plan.

Exercice 17 – Approfondissement — Étudier une famille d'intersections

Sur d , $x + y + z = 2$ pour tout t . Si $a = 2$, toute la droite est contenue dans le plan. Si $a \neq 2$, il n'y a aucune intersection : la droite est strictement parallèle au plan.

Exercice 18 – Approfondissement — Étudier une famille d'intersections

Sur d , $x + y + z = 3$ pour tout t . Si $a = 3$, toute la droite est contenue dans le plan. Si $a \neq 3$, il n'y a aucune intersection : la droite est strictement parallèle au plan.

Exercice 19 – Approfondissement — Étudier une famille d'intersections

Sur d , $x + y + z = 4$ pour tout t . Si $a = 4$, toute la droite est contenue dans le plan. Si $a \neq 4$, il n'y a aucune intersection : la droite est strictement parallèle au plan.

Exercice 20 – Approfondissement — Étudier une famille d'intersections

Sur d , $x + y + z = 5$ pour tout t . Si $a = 5$, toute la droite est contenue dans le plan. Si $a \neq 5$, il n'y a aucune intersection : la droite est strictement parallèle au plan.