

Chapitre 09 – Cours

Logarithme népérien et croissance comparée

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à :

- Manipuler logarithmes et exponentielles
- Étudier des fonctions contenant $\ln$

Comprendre les notions

Définition et propriétés

Définition – Notion de départ

La fonction logarithme népérien est la réciproque de l'exponentielle. Elle est définie sur $]0; +\infty[$ et vérifie $\ln(e^x) = x$, ainsi que $e^{\ln x} = x$ pour x positif. On a $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$. Pour a et b strictement positifs, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ et $\ln(a^r) = r \ln a$ lorsque l'expression est définie. En revanche, aucune formule ne transforme une somme en somme de logarithmes.

Étude de la fonction

Propriété – Lecture et conséquences

La dérivée de $\ln$ est $1/x$: le logarithme est strictement croissant. Sa limite est $-\infty$ en zéro et $+\infty$ à l'infini. Pour un entier positif n , $\ln x/x^n$ tend vers zéro à l'infini, tandis que $x^n \ln x$ tend vers zéro en zéro positif. Ces croissances comparées lèvent certaines indéterminations.

Première lecture : Méthodes et application

Propriété – Lecture et conséquences

Pour résoudre une équation contenant des logarithmes, commencer par imposer la positivité de chaque argument, puis utiliser les propriétés et l'injectivité de $\ln$. L'équation $\ln x + \ln(x+1) = \ln 2$ impose x positif, puis $x(x+1) = 2$. Ses racines algébriques sont

un et moins deux ; seule la première convient. Pour dériver $\ln(u(x))$, employer u'/u sur un intervalle où u est strictement positive. Une étude complète articule domaine, limites, dérivée et variations, avant de répondre à la question posée.

Un logarithme composé

Définition – Un logarithme composé

Pour une fonction u dérivable et strictement positive sur l'intervalle étudié, le logarithme composé se dérive en divisant sa dérivée par elle-même. La positivité est une condition d'existence, à traiter avant toute simplification.

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad \ln a = \ln b \iff a = b \quad (a, b > 0).$$

Une inéquation conserve son sens sous $\ln$, car cette fonction est strictement croissante. Une division ultérieure par un logarithme négatif inverse en revanche le sens de l'inégalité.

Deux exemples résolus


Exemple résolu – Résoudre une inéquation

1. Résolvons $\ln(x-1) \leq \ln 3$. Le domaine impose $x > 1$; on ne peut pas conserver les autres réels.
 2. Par stricte croissance du logarithme, l'inégalité équivaut à $x-1 \leq 3$, donc $x \leq 4$.
 3. En croisant les deux contraintes, on obtient $]1; 4]$. La borne un est exclue car le logarithme n'y existe pas ; quatre est incluse car l'inégalité est large.
-

Exemple résolu – Étudier un quotient logarithmique

1. Soit $f(x) = \ln x/x$ pour $x > 0$. La règle du quotient donne $f'(x) = (1 - \ln x)/x^2$.
 2. Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en e , reste positif avant e et devient négatif après : le maximum vaut $f(e) = 1/e$.
 3. À l'infini, la croissance comparée donne $f(x) \rightarrow 0$. En zéro positif, $\ln x \rightarrow -\infty$ et $1/x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.
-

Une représentation pour comprendre



La fonction logarithme : croissance lente et domaine strictement positif.

La courbe du logarithme passe par $(1; 0)$ et $(e; 1)$; elle monte en restant concave. Son asymptote verticale est l'axe des ordonnées. L'égalité $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ explique pourquoi des multiplications successives deviennent des additions. L'inégalité $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$ découle de la concavité et de la tangente en un. Elle est globale, tandis qu'écrire $\ln(1+h) \approx h$ décrit une approximation près de zéro.

Confondre ces deux lectures ferait perdre soit le sens de l'inégalité, soit le domaine de validité de l'approximation.

À retenir – Mini-bilan

Toujours imposer des arguments positifs. Le logarithme transforme produits et puissances, mais pas les sommes. Pour les limites indéterminées, utiliser les croissances comparées ; pour les variations, le quotient u'/u .
